

CONSUMO DE COCAÍNA, MARIGUANA Y METANFETAMINAS Y SU RELACIÓN CON CONDUCTAS ANTISOCIALES PRESENTADAS EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

Razo Guzmán Mitzi Roxana, Gaytán Flores Filiberto, López Brambila Miguel Angel, Moreno López Midiam, Bretón Cirett Michelle, Sánchez Pineda Vianney, Magaña Méndez Elsa Nancy.

INTRODUCCIÓN

Es motivo de gran preocupación el consumo de sustancias en la población joven, así como la alta incidencia de comportamientos de agresión y violencia en la que vive la sociedad actual.

Uno de los grupos más afectados es el de adolescentes, quienes son muy vulnerables, no sólo para ser víctima de agresiones, sino también a desarrollar este tipo de comportamientos, debido a una gran cantidad de factores (Rojas A y cols. 2005). Uno de los más relacionados al desarrollo de estas conductas es el consumo de alguna sustancia psicoactiva.

Las influencias del entorno, aumentadas por el hecho de que la adolescencia es una época de experimentación natural, llevan a la aparición de comportamientos de riesgo: inicio precoz de actividad sexual, uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas (Rebolledo y cols. 2004).

Debido a la curiosidad y a la búsqueda de sensaciones nuevas, esta etapa se vuelve favorable para usar drogas (Villatoro y cols. 2002). Asimismo, pasan por una serie de cambios cognitivos, personales y psicosociales que propician la violación de normas (Juárez y cols. 2005).

El consumo de sustancias tiene varias implicaciones negativas como, las conductas antisociales, depresión, problemas familiares, escolares incluyendo deserción escolar, entre otras (Berenzon y cols.1994).

En relación al tema de las conductas antisociales, hay diversos estudios en México y en otros países que confirman que el usar drogas y cometer actos antisociales son eventos que se relacionan de manera estrecha, donde se muestra que los jóvenes usuarios de drogas presentan tendencias significativamente mayores que los no usuarios a efectuar dichas conductas (Castro, 1988, citado en Galván y cols.1994).

Gittelman, et al., (1985) encontraron que los adolescentes que mostraron un mayor consumo en marihuana, derivados morfínicos, anfetaminas, drogas sintéticas y cocaína, presentaron un alto grado de conducta antisocial (Muñoz-Rivas, 2002).

Una amplia variedad y la alta frecuencia de conductas antisociales durante la infancia, son predictores para posterior persistencia de conductas antisociales más peligrosas, incluyendo el consumo de drogas (Robins, 1978 citado en Muñoz-Rivas, 2002).

En una muestra nacional de estudiantes, Castro y cols. (1986) hallaron una relación positiva entre conducta antisocial y consumo de sustancias: 0.52% para no usuarios, 1.62% leves, 3.1% moderados y 6.7% crónicos (Berenzon, 1994). Cabe señalar que en la mayoría de los fenómenos que estudia la psicología y disciplinas afines, no se presenta una relación lineal donde se pueda predecir por una variable la aparición de otra, por lo tanto no podemos decir que el uso de drogas conlleve a la realización de actos antisociales ni viceversa. La perspectiva básica más aceptada para entender esta asociación señala que la relación entre el consumo de drogas y las conductas antisociales no se establece por una asociación casual, ya que ambas conductas se explican por factores que comparten, tales como los económicos, sociales, psicológicos y a su vez depende esta unión de conductas del contexto y las situaciones (Watters, 1985, citado en Berenzon, 1994).

OBJETIVO

Conocer si el consumo de alguna sustancia (marihuana, cocaína o metanfetaminas) está asociado con un mayor número de actos antisociales, en estudiantes de nivel medio superior y superior de una universidad de México.

MÉTODO

El diseño de muestra fue estratificado por plantel o escuela. Por conglomerados, La unidad de selección fue el grupo escolar al interior de cada escuela. La muestra obtenida de grupos y alumnos es ponderada por escuela, con objeto de realizar la estimación y el procesamiento de datos. La tasa de no respuesta fue del 15%, con nivel de confianza del 95% y un error absoluto de promedio de 0.004.

Se tomó en cuenta a la muestra completa, la cual consta de un total 40,029 estudiantes de nivel medio superior y superior. Se utilizó un cuestionario estandarizado, donde la mayor parte de sus escalas han sido aplicadas en encuestas anteriores y han sido previamente validadas (Villatoro y cols. 2002, 2005). Se utilizó la escala de actos antisociales leves y graves validada previamente en investigaciones realizadas en la Ciudad de México. Consta de 13 reactivos, 12 con respuesta dicotómica y una abierta, también se incluyen a los estudiantes que hayan consumido por lo menos una vez en la vida marihuana, cocaína y/o metanfetaminas.

Este proyecto se realizó gracias al apoyo del Macroproyecto Desarrollo de Nuevos Modelos para la Prevención y el Tratamiento de Conductas Adictivas

RESULTADOS

Para obtener los resultados, se realizó la prueba de Chi cuadrada, y se obtuvieron diferencias significativas ($p=0.000$) en todas las variables analizadas, comparando los grupos de consumo de sustancias.

Para actos antisociales considerados graves, de acuerdo a la sustancia y al tipo de usuario, los porcentajes más elevados son para los usuarios regulares de metanfetaminas tanto para hombres (26.9%) como para mujeres (24.7%) seguido de los usuarios regulares de cocaína con 23.2% para hombres y 17.2% para mujeres y finalmente para usuarios regulares de marihuana el porcentaje para hombres es de 15.6% y para las mujeres de 9.0%. En cuanto a los usuarios experimentales hombres el porcentaje es más alto en metanfetaminas (18.9%), seguido de cocaína (16.3%) y por último marihuana (8.6%) y para el caso de mujeres el porcentaje es de 11.9% para metanfetaminas, 9.5% para cocaína y de 4.0% para marihuana. Los no usuarios son los que presentaron menores porcentajes de acuerdo al sexo y tipo de sustancia, teniendo que los hombres presentan 5.4% para metanfetaminas, para cocaína 5.1% y 4.3% para marihuana; en cuanto a las mujeres tanto para metanfetaminas como para cocaína presentan 1.8% y para marihuana 1.5% (Gráfica 1).

En cuanto a los actos antisociales considerados leves los datos más altos son de los usuarios regulares de metanfetaminas con 62.0% para hombres y 50.9% para mujeres seguido de los usuarios regulares de cocaína (57.7% para hombres y 42.0% para mujeres) y finalmente para usuarios regulares de marihuana el porcentaje de hombres es de 50.8% y para las mujeres de 36.4%. En cuanto a los usuarios experimentales de metanfetaminas el porcentaje para hombres es de 60.0% de cocaína es de 49.4% y de marihuana 43.3% y para mujeres usuarios experimentales el porcentaje es de 40.7% para metanfetaminas, 38.7% para cocaína y de 25.7% para usuarias experimentales de marihuana. Los no usuarios son los que presentaron menores porcentajes de acuerdo al sexo y tipo de sustancia, teniendo que los hombres presentan 31.7% para metanfetaminas, para cocaína 31.4% y 28.4% para marihuana; en cuanto a las mujeres para metanfetaminas el 14.8% reportan actos antisociales considerados leves, el 14.7% de las no usuarias de cocaína y para marihuana 13.1% (Gráfica 2).

Tabla 2. Relación entre Actos antisociales y consumo de Marihuana, Cocaína y Metanfetaminas en la población masculina



	Actos Graves %	No actos graves %	χ^2	Actos leves %	No actos leves %	χ^2
HOMBRES						
Marihuana						
No usuario	4.3	95.7	4.202	28.4	71.6	5.729
Usuario Experimental	8.6	91.4		43.3	56.7	
Usuario Regular	15.6	84.4		50.8	49.2	
Cocaína						
No usuario	5.1	94.9	4.333	31.4	68.6	2.601
Usuario Experimental	16.3	83.7		49.4	50.6	
Usuario Regular	23.2	76.8		57.7	42.3	
Metanfetaminas						
No usuario	5.4	94.6	3.468	31.7	68.3	2.868
Usuario Experimental	18.9	81.1		60.0	40.0	
Usuario Regular	26.9	73.1		62.0	38.0	

*Las χ^2 tienen una significancia de $p=0.000$

Tabla 1. Relación entre Actos antisociales y consumo de Marihuana, Cocaína y Metanfetaminas en la población femenina

	Actos Graves %	No actos graves %	χ^2	Actos leves %	No actos leves %	χ^2
MUJERES						
Marihuana						
No usuario	1.5	98.5	2.699	13.1	86.9	5.336
Usuario Experimental	4.0	96.0		25.7	74.3	
Usuario Regular	9.0	91.0		36.4	63.6	
Cocaína						
No usuario	1.8	98.2	2.836	14.7	85.3	2.729
Usuario Experimental	9.5	90.5		38.7	61.3	
Usuario Regular	17.2	82.8		42.0	58.0	
Metanfetaminas						
No usuario	1.8	98.2	3.971	14.8	85.2	2.574
Usuario Experimental	11.9	88.1		40.7	59.3	
Usuario Regular	24.7	75.3		50.9	49.1	

*Las χ^2 tienen una significancia de $p=0.000$



CONCLUSIONES

Es notoria la diferencia entre los jóvenes consumidores y los no consumidores, ya que los primeros, presentan una tendencia mayor a cometer actos antisociales, misma que se incrementa según la frecuencia del consumo. Los resultados que aquí se presentan, muestran que la cocaína y las metanfetaminas son las drogas que tuvieron los más altos porcentajes en cuanto a los actos antisociales, a diferencia de la marihuana, Galván y cols. (1994) encuentran que los usuarios de cocaína presentan más comportamientos problemáticos y conductas antisociales, en relación con otras drogas.

También observamos una diferencia entre los actos antisociales considerados como graves a los actos antisociales leves, ya que estos últimos presentan porcentajes mayores, que coincide con Juárez y cols. (2005) que mencionan que los actos antisociales considerados como graves en los estudiantes se han documentado en proporción menor.

Por lo anteriormente dicho es importante promover los modelos adecuados en prevención de adicciones a los alumnos y que los proyectos sean actuales, ya que como sabemos este tipo de problemáticas sufren cambios de acuerdo al contexto social en el que se va desarrollando el estudiante, asimismo crear proyectos enfocados en difundir actividades culturales y deportivas para que los/las jóvenes se interesen en ellos teniendo más opciones de esparcimiento, buscando una alternativa a no dar espacio a que se sigan presentando estas problemáticas.

REFERENCIAS

- Berenzon, S., López, E., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Juárez, F., Carreño, S., Galván, J., Rojas, E., (1994). Uso de inhalables entre estudiantes y conductas relacionadas al consumo. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México D.F.
- Galván, J., Medina-Mora, M.E., Villatoro, J., Rojas, E., Berenzon, S., Juárez, F., Carreño, S., López, E., (1994). Conducta antisocial asociada al uso de cocaína en estudiantes de enseñanza media y media superior del Distrito Federal. Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, 1994. México D.F.
- Juárez, F., Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Fleiz, C., Medina-Mora, M.E., (2005). Tendencias de la conducta antisocial en estudiantes del distrito federal: Mediciones 1997-2003. Salud Mental, Vol.28, No. 3, junio 2005.
- Muñoz-Rivas, M.J., Graña, J.L., Peña, M.E., Andreu, J.M., (2002). Influencia de la conducta antisocial en el consumo de drogas ilegales en población adolescente Adicciones, Vol. 14. No. 3, 313-320, 2002
- Rebolledo, E., Medina, N., Pillon, S.C., (2004). Factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolescentes. Latinamerican Journal of Nursing; Vol. 12, (número especial):369-75. Marzo-abril 2004.
- Rojas, A., (2005) Comportamiento antisocial y consumo de sustancias psicoactivas en escolares adolescentes de Lima Metropolitana. Revista Electrónica del Instituto Psicología y Desarrollo, Año II. No. 5, Agosto 2005. ISSN 1811-847X.
- Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C., Bermúdez, P., Castro, P., Juárez, F., (2002) ¿Ha cambiado el consumo de drogas de los/las estudiantes? Resultados de la encuesta de estudiantes. Medición otoño del 2000. Salud Mental, Vol. 25, No. 1, febrero 2002.

CONTACTO

Mitzi Roxana Razo Guzmán mitzirazo81@imp.edu.mx Tel: 36408752 www.inpsiquiatria.edu.mx/javv
Diseño: Paredes Mendoza Aurora, Meneses Templos Marisol

